




*Շրջակա միջավայրի նախարարության
«Հիդրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ*

ԱԳՐՈՕԴԵՐՆՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

2025


Հուլիսի երրորդ տասնօրյակ

*Տեղեկագիրը կազմել է ագրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավարը՝
ագրոոդերոկլիմայի և մոնիթորինգի կենտրոնի ղեկավարի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ*

Տեղեկագրի պատասխանատու՝ տնօրենի տեղակալ Գ. Սուրենյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հուլիսի երրորդ տասնօրյակում օդի միջին ջերմաստիճանը հանրապետությունում բարձր է եղել նորմայից 2-3 աստիճանով:




Տասնօրյակի ամենաբարձր ջերմաստիճանները դիտվել են հուլիսի 30-ին և 31-ին. Տավուշում գրանցվել է $+35...+37^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+30...+32^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+39...+41,5^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+36...+38^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+32...+34^{\circ}\text{C}$, Շիրակում՝ $+31...+36^{\circ}\text{C}$, Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+30...+34^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+36...+38^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+29...+32^{\circ}\text{C}$, Լոռիում՝ $+30...+34^{\circ}\text{C}$, Արմավիրում, Արարատում՝ $+39...+41,5^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+31...+33^{\circ}\text{C}$, նախալեռններում՝ $+36...+40^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ամենացածր ջերմաստիճանները դիտվել են 26-28-ն ընկած ժամանակահատվածում. Շիրակում գրանցվել է $+12...+14^{\circ}\text{C}$ (Աշոցք՝ $+6^{\circ}\text{C}$), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ $+13...+15^{\circ}\text{C}$ (Հանքավան՝ $+8^{\circ}\text{C}$), նախալեռնային շրջաններում՝ $+17...+19^{\circ}\text{C}$, Տավուշում $+17...+19^{\circ}\text{C}$, Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ $+10...+12^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+19...+21^{\circ}\text{C}$, Սյունիքի հովտային շրջաններում՝ $+18...+23^{\circ}\text{C}$, նախալեռնային շրջաններում՝ $+10...+15^{\circ}\text{C}$, Գեղարքունիքում՝ $+9...+14^{\circ}\text{C}$ (Գավառ՝ $+8^{\circ}\text{C}$), Լոռիում՝ $+11...+15^{\circ}\text{C}$ (Տաշիր՝ $+9^{\circ}\text{C}$), Արմավիրում՝ $+16...+20^{\circ}\text{C}$, Արարատում՝ $+18...+21^{\circ}\text{C}$, Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ $+8...+11^{\circ}\text{C}$, նախալեռններում՝ $+16...+21^{\circ}\text{C}$:

Տասնօրյակի ընթացքում տեղումների գումարային քանակը Շիրակում կազմել է 2-4մմ (13-23%), Լոռիում՝ 3-33մմ (15-174%), Տավուշում՝ 0.6-5մմ (7-26%), Արագածոտնի լեռնային շրջաններում՝ Ծաղկահովիտում 13մմ-50%, նախալեռներում՝ 2-3մմ (33-43%), Գեղարքունիքում՝ 1-31մմ (5-172%), Կոտայքի լեռնային շրջաններում՝ 0.4-14մմ (2-70%), նախալեռներում՝ 2մմ (25%), Վայոց ձորի լեռնային շրջաններում՝ 23մմ (153%), նախալեռներում տեղումներ չեն դիտվել, Արմավիրում՝ 08-16մմ (20-267%), Արարատում՝ 0.1-1մմ (2-25%), Սյունիքում տեղումներ դիտվել են միայն Սիսիանում՝ 0.5մմ (6%):



Հողի մակերևույթի նվազագույն ջերմաստիճանները գրանցվել են հուլիսի 26-ին և 27-ին. լեռնային շրջաններում՝ +6...+12°C, նախալեռնային շրջաններում՝ +10...+15°C, հովտային շրջաններում՝ +17...+22°C:



Տասնորյակի ընթացքում դիտված բարձր ջերմային ֆոնի, տեղումների սակավության հետևանքով մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար կարևոր գործոն հանդիսացող հողի խոնավության պաշարներն անցյալ տասնորյակի համեմատ նվազել են 2-6%-ով:

Լեռնային շրջաններում 20սմ խորության վրա կազմել են 13-30%, նախալեռնային շրջաններում՝ 14-35%, հովտային շրջաններում՝ 11-25%: Հողի 40սմ խորության շերտում լեռնային շրջաններում կազմել են 15-35%, նախալեռնային շրջաններում՝ 16-40%, հովտային շրջաններում՝



Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը

Տասնորյակի ընթացքում հանրապետությունում շարունակել է մշակաբույսերի հասունացումը:

Հովտային շրջաններում սկսվել է խաղողի հասունացումը, կատարվել է բանջարանոցային մշակաբույսերի և ձմերուկի բերքահավաք: Շարունակվել է ծխախոտի տերևների հասունացումը, կատարվել է տերևաքաղ:

Լեռնային և նախալեռնային շրջաններում շարունակվել է բանջարանոցային մշակաբույսերի և պտղատուների հասունացումը:

Պտղատուների մոտ տեղի է ունենում շաքարային նյութերի կուտակում:

Լեռնային շրջաններում կատարվել է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաք:

Բուսականության սթրեսի ինդեքս

Հուլիսի երրորդ տասնօրյակում հանրապետությունում գրանցված բարձր ջերմային ֆոնը, տեղումների սակավությունը և օդի ցածր հարաբերական խոնավությունը բացասաբար կանդրադառնա բերքի քանակի և որակի վրա: Բոլոր մշակաբույսերը լրացուցիչ ոռոգման կարիք ունեն:

Վեգետացիոն ինդեքսի ընթացիկ ընթացքն անցյալ տարվա և բազմամյա միջինի համեմատ

ՀՀԿԶԶ

